



Doze recomandate levotiroxină solubilă **ADULȚI**

Levotiroxină solubilă	Unitate măsură
12,5 mcg	0,6 ml
20 mcg	1 ml
25 mcg	1,2 ml
40 mcg	2 ml
50 mcg	2,5 ml
70 mcg	3,5 ml
75 mcg	3,7 ml
80 mcg	4 ml
90 mcg	4,5 ml
100 mcg	5 ml
125 mcg	6,2 ml
150 mcg	7,5 ml
175 mcg	8,7 ml
200 mcg	10 ml
225 mcg	11,2 ml
250 mcg	12,5 ml
275 mcg	13,7 ml
300 mcg	15 ml



Doze recomandate levotiroxină solubilă NOU-NĂSCUȚI, SUGARI, COPII ȘI ADOLESCENȚI

Nou-născuți și sugari cu hipotiroidism congenital, recomandarea dozelor de levotiroxină:

0-3 luni	10-15 mcg/kgc/zi
3-6 luni	8-10 mcg/kgc/zi
6-12 luni	6-8 mcg/kgc/zi

Copii și adolescenți cu hipotiroidism dobândit, recomandarea dozelor de levotiroxină:

1-5 ani	5-6 mcg/kgc/zi
6-12 ani	4-5 mcg/kgc/zi
> 12 ani	2-3 mcg/kgc/zi

Doza trebuie ajustată individual, în funcție de rezultatele clinice și de valorile concentrațiilor plasmatice ale hormonilor tiroidieni și TSH până se obține întreaga doză a tratamentului de substituție.

Levotiroxină solubilă	Unitate măsură
10 mcg	0,5 ml
12,5 mcg	0,6 ml
15 mcg	0,7 ml
18 mcg	0,9 ml
20 mcg	1 ml
25 mcg	1,2 ml
30 mcg	1,5 ml
35 mcg	1,7 ml
40 mcg	2 ml
45 mcg	2,2 ml
50 mcg	2,5 ml