



CARIPRAZINA

1.5 • 3 • 4.5 • 6 mg



Doza inițială recomandată de Reagila este de 1,5 mg.¹

Doza inițială recomandată de cariprazină este de 1,5 mg, administrată o dată pe zi. Ulterior, doza poate fi crescută lent, cu câte 1,5 mg, la nevoie, până la o doză maximă de 6 mg pe zi. Pentru menținerea tratamentului trebuie utilizată doza cea mai mică eficientă.¹



Fiecare pacient trebuie evaluat individual. Conform studiilor existente, titrarea cariprazinei poate fi mai lentă sau mai rapidă, în funcție de răspunsul terapeutic..²

SCHEMA DE TITRARE PENTRU REAGILA

	Ziua 1	Ziua 2	Ziua 3	Ziua 4	Din ziua 5 - a
Rapid	1.5 mg	3 mg	4.5 mg	6 mg	6 mg
Lent	1.5 mg	Perioada de titrare se adaptează în funcție de răspunsul individual al pacientului, tolerabilitatea tratamentului; conform raționamentului clinic al medicului curant.			

În studiile clinice titrarea rapidă
Ziua 1: 1.5 mg Ziua 2: 3 mg Ziua 3: 4.5 mg Ziua 4: 6 mg
a fost în general bine tolerată.²

Datorită proprietăților farmacologice ale medicamentului REAGILA (starea de echilibru este atinsă după 4 săptămâni) se poate face o titrare mai lentă, monitorizând instalarea efectului terapeutic în funcție de doza administrată. Această abordare poate fi potrivită pentru pacienții care nu se află în faza de exacerbare a simptomelor.

1x
pe zi


Se administrează pe cale orală, o dată pe zi, în aceeași perioadă a zilei, cu sau fără alimente.¹

Reagila este indicat ca monoterapie pentru tratamentul schizofreniei, inclusiv pentru simptomatologia negativă din schizofrenie.¹




Când se face trecerea de la un antipsihotic la REAGILA este recomandată o titrare încrucișată.

ÎN SCHIZOFRENIE



Medicația antipsihotică anterior folosită trebuie retrasă într-o săptămână, în aceeași perioadă se inițiază și se va crește doza de Reagila.




În cazul anumitor medicații antipsichotice (asenapină, olanzapină, quetiapină, clozapină) se recomandă o retragere mai lentă a terapiei (3-4 săptămâni), pentru a permite adaptarea pacienților la efectele blocării receptoriale colinergici, histaminergici și alfa-1 adrenergici.³



La pacienții cu simptomatologie negativă se recomandă o titrare încrucișată mai lentă, pentru reducerea riscului destabilizării pacientului.

SCHIZOFRENIA CU SIMPTOMATOLOGIE NEGATIVĂ



În studiile clinice s-a folosit o tritrare încrucișată în 2 săptămâni (reducerea dozei antipsihoticului anterior cu 50-75% în săptămâna 1 și la fel cu 50-75% în săptămâna 2, simultan în aceeași perioadă se titrează doza de REAGILA cu 1,5 mg în săptămâna 1 și 3 mg în săptămâna 2). La începutul săptămânii 3 este retrasă total medicația antipsichotică anterioară și doza de REAGILA este crescută la 4,5 mg pe zi.⁴ Titrarea încrucișată a fost bine tolerată fără a destabiliza statusul pacientului cronic.



La schimbarea terapiei REAGILA cu un alt antipsihotic, nu este necesară o titrare încrucișată graduală.


Datorită timpului de înjumătățire lung al produsului REAGILA, terapia se poate opri imediat (conc plasm. scade cu 50% în săptămâna 1 și peste 90% în săptămâna 3). Tratamentul cu noul antipsihotic trebuie inițiat cu cea mai mică doză și menținând-o până la eliminarea totală a cariprazinei din organism.¹



Când schizofrenia modifică viața
Reagila® schimbă povestea



PROFILUL CONCENTRAȚIEI PLASMATICE MEDII ÎN FUNCȚIE DE TIMP, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ 12 SĂPTĂMÂNI DE TRATAMENT CU CARIPRAZINĂ 6mg/zi⁵



Cariprazina totală: suma concentrațiilor de cariprazină (CAR), DCAR și DDCAR
CAR – cariprazina; DCAR – desmetilcariprazina; DDCAR – didesmetilcariprazina

După întreruperea tratamentului, concentrația plasmatică a cariprazinei totale va scădea treptat. Acesta scade **cu 50% în ~ 1 săptămână și cu 90% în ~ 3 săptămâni**.

Înainte de prescriere vă rugăm consultați rezumatul caracteristicilor produsului, care este disponibil la cerere sau se poate vizualiza: www.gedeon-richter.ro. Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății. Pentru mesaje de siguranță și informații medicale: E-mail: pharmacovigilance@gedeon-richter.ro sau tel: +40-265-257.011

Referințe: 1) Rezumatul Caracteristicilor Produsului REAGILA 2) Reagila clinical studies: NCT00404573, NCT00694707, NCT01104766, NCT01104779 3) Stahl S, Stahl's Essential Psychopharmacology Prescriber's Guide, 6th edition, Cambridge University Press, 2017 4) Reagila clinical study EudraCT 2012-005485-36 5) Nakamura T, Drug Design, Development and Therapy 2016;10 1-12

KEDP/DAC5VP



Când schizofrenia modifică viața
Reagila® schimbă povestea



GHID DE DOZARE REAGILA

4 doze

REAGILA este disponibil sub formă de capsule:
1.5 • 3 • 4.5 • 6 mg¹

