

Un studiu multicentric, prospectiv, observațional, la pacienții cu EMD tratați cu EYLEA® în practica clinică în Franța.

CU TRATAMENT INTENSIV ȘI PRECOCE ÎN PRIMUL AN ÎN EMD*, EYLEA OFERĂ CÂȘTIGURILE DE VEDERE PROMISE ÎN RCT** ȘI ÎN PRACTICA CLINICĂ UZUALĂ¹

Rezultate din Practica Clinică Uzuală după 12 luni de monoterapie cu aflibercept la pacienții cu edem macular diabetic în Franța: rezultatele studiului APOLLON

Korobelnik, J. F., Daien, V., Faure, C., Tadayoni, R., Giocanti-Auregan, A., Dot, C., Kodjikian, L. y Massin, P. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol.* 2020; 258(3):521-528.

*EMD=edem macular diabetic;
VEGF=factor endotelial de creștere vasculară;
**RCT=studiu clinic controlat randomizat




EYLEA®
(aflibercept soluție injectabilă)




EYLEA® OFERĂ CÂȘTIGURI DE VEDERE MAI BUNE LA PACIENȚII NAIVI COMPARATIV CU PACIENȚII TRATAȚI ANTERIOR¹

Obiectiv principal: Câștigul de vedere de la momentul inițial până în Luna 12^a



Adaptat după Korobelnik JF, Daien V, Faure C, et al. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2020.

Câștig/pierdere de AVOC (litere ETDRS)



Adaptat după Korobelnik JF, Daien V, Faure C, et al. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2020.

- Numărul mediu de injecții a fost de 7,6 pentru ambele grupuri în luna 12.


^aObiectivul primar a fost modificarea față de valoarea inițială a AVOC la 12 luni în grupul cu pacienți naivi și în grupul cu pacienți tratați anterior. Obiectivele secundare au inclus modificarea față de valoarea inițială a AVOC la întreaga populație la 12 luni, modificarea CRT* de la momentul inițial la Luna 12 pentru toate grupurile, frecvența injecțiilor pe parcursul a 12 luni și proporția pacienților cu evenimente de siguranță.

AVOC=acuitatea vizuală optim corectată; *CRT=grosimea centrală a retinei;
ETDRS=Early Treatment Diabetic Retinopathy Scale
Pacienți naivi = pacienți netratați anterior.



CÂȘTIGURI DE VEDERE DE NEEGALAT CU 5 DOZE INIȚIALE LA PACIENȚII NAIVI^{1,2}

Câștigul de vedere la Luna 12 la pacienții naivi cu sau fără 5 doze inițiale lunar



Procentul pacienților naivi cu câștiguri de vedere la Luna 12

	Au primit toate cele 5 doze inițiale	Au primit mai puțin de 5 doze
Câștig ≥ 10 litere ETDRS	53% (n=21)	38% (n=14)
Câștig ≥ 15 litere ETDRS	35% (n=14)	24% (n=9)

- Evenimentele adverse raportate în studiul APOLLON au fost în concordanță cu profilul de siguranță cunoscut al EYLEA

EYLEA: ÎNCEPEȚI ÎN FORȚĂ CU 5 DOZE LUNAR³

INJEȚII
5 injecții inițiale
lunare de EYLEA®



EXTINDERE PROACTIVĂ



DUPĂ 52 DE SĂPTĂMÂNI

Extindeți PROACTIV intervalul de injectare pentru a menține rezultate vizuale și / sau anatomice stabile.

**DOVEZI
DIN PRACTICA
CLINICĂ UZUALĂ**

EYLEA®
(aflibercept soluție injectabilă)