


Sigur în administrare³



Persistă în concentrație mare la locul aplicării, absorbție sistemică scăzută $< 1,8\%$.³

(ref. 3)

Nu dezvoltă rezistență la fungi⁴

Bine tolerat la nivelul mucoasei⁵

LOMEXIN®
Nitrat de fenticonazol

Keynote:

1. Belaisch A G et al. *Contracept Fertil Sex*. 1996; 24(5):417-422
2. Lawrence A G et al. *Current Med. Res. and Opin* 1990; 12(2):114-9
3. Novelli A et al. *Journal of Chemotherapy* 1991; 3(1): 23-27
4. Petit P et al. *J of Chemotherapy* 1999; 11(Suppl 3):3-42
5. Rezumatul caracteristicilor produsului

0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

NUMARUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ: 9428/01-02
Data ultimei reînnoiri a autorizației: Octombrie 2016
DATA REVIZIILOR TEXTULUI: Octombrie 2016

DE ÎNĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PLAJĂ RECORDATI S.p.A.

a unei reacții alergice. **Natura și conținutul ambalajului:** Cutie cu un tub din Al și aplicator a / 8 g crema.

[illegible]

LO-01/2019

Str. Steiulei nr. 28A, București, România
Tel.: +40 21 667 17 41; Fax +40 21 667 17 42
website www.recordati.ro



Acest material care se eliberează pe baza de prescripție medicală P-6L
Acet material este dedicat profesioniștilor din domeniul sănătății

Data ultimei reînnoiri a autorizației: Aprilie 2015 Data revizuirii textului: Aprilie 2015
 Definitorul autorizației de punere pe piață: Recordati S.p.A.
 Via M. Civitali 1,20148 Milano (MI), Italia
 Clasificarea privind modul de eliberare:

Lomexin® 1000 mg: 7595/2015/01

[illegible]

LOMEXIN®
Nitrato de fenticonazol

Tratamentul de elecție al candidozelor vulvo-vaginale suprainfectate sau nu cu bacterii Gram+




GROUP

RECORDATI ROMANIA


Eficiență clinică dovedită

1




AMELIOREAZĂ RAPID SIMPTOMELE
Pruritul și senzația de arsură sunt reduse semnificativ încă din a doua zi de administrare în 80% din cazuri.¹

GRAD DE RECURENȚĂ SCĂZUT
În candidoza vaginală gradul de recurență este minim la 30 de zile după administrare în doză unică.²



Complianță crescută



Alternative în tratamentul candidozelor vulvo-vaginale

Gamă diversificată ce asigură tratamentul optim al zonei genitale interne și externe

CANDIDOZE GENITALE (VULVO-VAGINITE, CERVICITE) SUPRAINFECTATE SAU NU CU BACTERII GRAM +



600mg în administrare unică, în cazul micozei recidivante poate fi efectuată o nouă administrare după un interval de 3 zile.

CANDIDOZE GENITALE ALTERNATIVA PENTRU PACIENTELE CU MUCOASĂ VAGINALĂ USCATĂ



INFECȚII CU TRICHOMONAS VAGINALIS INFECȚII MIXTE CU CANDIDA ALBICANS ȘI TRICHOMONAS VAGINALIS



1000mg în administrare unică, în cazul micozei recidivante poate fi efectuată o nouă administrare după un interval de 3 zile. Pentru tratamentul infecției cu Trichomonas vaginalis, asociată sau nu cu candida, doza recomandată este de 1000mg în administrare unică, urmată, dacă este necesar de o a doua administrare a 1000mg după un interval de 24 ore.

3