



**OCUVITE COMPLETE - Doza recomandată pentru consumul zilnic
2 capsule / zi:**

Ingrediente	Pentru 1 capsulă	Pentru 2 capsule
Zinc	7,5 mg	15 mg
Vitamina C	90 mg	180 mg
Vitamina E (echivalent la α -tocoferol)	15 mg	30 mg
Luteină	5 mg	10 mg
Zeaxantină	1 mg	2 mg
Ulei de pește	508 mg	1015 mg
cu conținut de Acizi grași Omega 3	300 mg	600 mg
ce conțin DHA	180 mg	360 mg



**OCUVITE LUTEIN forte - Doza recomandată pentru consumul zilnic
1 - 2 comprimate / zi:**

Componente	Pentru 1 comprimat	Pentru 2 comprimate
Zinc	5 mg	10 mg
Vitamina C	60 mg	120 mg
Vitamina E (echivalent la α -tocoferol)	8,8 mg	17,6 mg
Seleniu	20 micrograme	40 micrograme
Luteină	6 mg	12 mg
Zeaxantină	0,5 mg	1 mg

Gama Ocuville

Suplimente alimentare

Să ne păstrăm bucuria vederii!

Referințe: 1. Kassoff A, Kassoff J, Kieval S, et al; Age-Related Eye Disease Research Group. A randomized, placebo controlled, clinical trial of high dose supplementation with vitamins C and E, betacarotene and zinc for age-related macular degeneration and vision loss: AREDS Report No. 8. Arch Ophthalmol. 2001; 119 (10): 1417-1436; 2. National Institutes of Health. National Institute Web site. Facts about age related macular degeneration. http://www.nei.nih.gov/health/maculardegen/armd_facts.asp accessed May2, 2011; 3. Fletcher AE, Bentham GC, Agnew M, et al; Sunlight exposure, antioxidants and age-related degeneration. Arch Ophthalmol. 2008;126 (10): 1396-1403; 4. Tan JSL, Wang JJ, Flood V, Mitchell P Dietary fatty acids and the 10-year incidence of a age-related macular degeneration: the Blue Mountain Eye Study. Arch Ophthalmol 2009; 127 (5):656-665; 5. Evans JR, Fletcher AE, Wormald RPL 28.000 cases of age related macular degeneration causing visual loss in people aged 75 years and above in the United Kingdom may be attribute to smoking. Br J Ophthalmol. 2005;89:550-553; 6. Ambati J, Ambati BK, Yoo SH, Ianchuler J, Adamis AP. Age-related macular degeneration: etiology, pathogenesis and therapeutic strategies. Surv Ophthalmol 2003; 48(3):257-293; 7. Tan JSL, Wang JJ, Flood V, Rotchina E, Smith W, Mitchell P. Dietary antioxidants and the long term incidence of age-related macular degeneration: the Blue Mountain study. Ophthalmology 2008; 115 (2):334-341; 8. San Giovanni JP, Chew EY, Clemons TE, et al; Age-Related Eye Disease Study Research Group. The relationship of dietary carotenoid and vitamin A, E and C intake with age-related macular degeneration in a case control study AREDS Report No. 22 Arch Ophthalmol 2007; 125 (9):1225 - 1232; 9. Van Leeuwen R, Boekhoorn S, Vingerling JR, et al. Dietary intake of antioxidants and risk of age related macular degeneration. JAMA. 2005; 294(24):3101-3107; 10. SanGiovanni JP, Agron E, Meleth AD, et al; AREDS Research Group. Omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acid intake and 12-y incidence of neovascular age-related macular degeneration and central geographic atrophy: AREDS Report 30, a prospective cohort study from the Age-Related Eye Disease Study. Am J Clin Nutr. 2009;90(6):1601-1607

Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății. Pentru raportarea evenimentelor adverse vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:
Tel: +4 0374 102 600 , Fax: +4 0374 102 601, Email: pharmacovigilanceromania@bauschhealth.com,

Gama Ocuville

Suplimente alimentare

Să ne păstrăm
bucuria vederii!




Abordarea degenerescenței maculare legată de vârstă (DMLV)
cu ajutorul nutriției oculare demonstrată științific*

Degenerescenta maculară legată de vârstă (DMLV) este cauza principală a orbirii centrale la persoanele cu vârstă de peste 65 ani¹

Ce este DMLV?

Degenerescenta maculară legată de vârstă (DMLV) este o boală care afectează vederea centrală, cea care vă permite să vedeți clar detalii, cum sunt expresia facială a persoanei iubite, cuvintele de pe o pagină sau scările din casă.

DMLV este o afecțiune a maculei – o zonă de mici dimensiuni din centrul retinei, responsabilă de vederea centrală. Boala se poate agrava odată cu înaintarea în vârstă, persoanele mai vârstnice prezintă un risc mai mare; de asemenea femeile au un risc mai crescut de a avea DMLV decât bărbații.



Alți factori de risc pentru DMLV:


- fumatul;
- regimul alimentar necorespunzător;
- antecedentele familiale.




- ▶ factorul de risc nr. 1²
- ▶ la vârsta de 50 de ani, 2% dintre persoane prezintă riscul apariției DMLV²
- ▶ la vârsta de 75 de ani, aproape 30% dintre persoane prezintă acest risc²



- Regimul din care lipsesc:
- ▶ minerale și antioxidanți³
 - ▶ carotenoizi³
 - ▶ acizi grași esențiali⁴



- ▶ Fumătorii și foștii fumători prezintă un risc dublu decât nefumătorii⁵



- ▶ Rudele de gradul 1 ale persoanelor cu DMLV prezintă un risc triplu de apariție a DMLV⁶

Gama Ocuvite conține 3 categorii de substanțe nutritive demonstrate a reduce riscul DMLV

REDUCEREA RISCULUI

Stadiu incipient — Stadiu avansat

1. VITAMINE ANTIOXIDANTE ȘI ZINC

- ▶ Ajută la neutralizarea excesului de radicali liberi și reduc stresul oxidativ;

35%⁹

van Leeuwen 2005

28%¹

AREDS Raport 8

2. LUTEINĂ / ZEAXANTINĂ

- ▶ Formează pigmentul macular protector care ajută la filtrarea luminii albastre nocive

65%⁷

The Blue Mountains Eye Study

55%⁸

AREDS Raport 22

3. ACIZI GRAȘI OMEGA-3

- ▶ Aceste substanțe nutritive esențiale sunt necesare pentru menținerea vederii normale, dar nu sunt produse de organism și pot fi obținute doar din alimente și suplimente alimentare

37%⁴

The Blue Mountains Eye Study

35%¹⁰

AREDS Raport 30

Gama Ocuvite conține substanțe nutritive cu beneficii demonstrate științific:

- ✓ **Vitamine și minerale** ce ajută la reducerea riscului de progresie de la DMLV moderată la DMLV avansată¹;
- ✓ **Acizi grași Omega-3 și carotenoizi (luteină și zeaxantină)** ce ajută la reducerea riscului debutului DMLV la pacienții cu factori de risc sau DMLV în stadiu incipient^{7,8}.

Gama Ocuvite

Suplimente alimentare

Să ne păstrăm bucuria vederii!

BAUSCH + LOMB

