

Experiența Dumneavoastră cu Latanoprost îmbracă o nouă formă

Arulatan

Latanoprost
50 micrograme/ml picături oftalmice, soluție

Arucom

Latanoprost / Timolol
50 micrograme/ml + 5 mg/ml picături oftalmice, soluție



Produse compensate 100%

Referințe:

1. Parrish et al.- American Journal of Ophthalmology 2003;135:688-703;
2. Rigollet et al.-Clinical Ophthalmology 2011;5:187-9.1;
3. Arulatan 50 micrograme/ml picături oftalmice, soluție - Rezumatul caracteristicilor produsului, Martie 2020; Prospectul pentru pacient, Martie 2020;
4. EGS - Terminology and Guidelines for Glaucoma, ediția a 4-a 2014;
5. Arucom 50 micrograme/ml + 5 mg/ml picături oftalmice, soluție - Rezumatul caracteristicilor produsului, Ianuarie 2020.

PIO = Presiune intraoculară;
SEM = Eroare standard a PIO medie;
GUD = Glaucom cu unghi deschis.

Acest material este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății.
Pentru informații complete consultați Rezumatul Caracteristicilor Produsului, disponibil la cerere/ce poate fi consultat pe website ul ANMDMR (<https://www.anm.ro/nomenclator/medicamente>).
Pentru raportarea evenimentelor adverse vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:
Tel: +4 0374 102 600, Fax: +4 0374 102 601, Email: pharmacovigilanceromania@bauschhealth.com

Arulatan

Latanoprost
50 micrograme/ml picături oftalmice, soluție

Arucom

Latanoprost / Timolol
50 micrograme/ml + 5 mg/ml picături oftalmice, soluție



Echilibrul optim

Eficacitate^{1,2}
în reglarea
presiunii
intraoculare

între


Tolerabilitate^{1,2}

Arulatan


Latanoprost
50 micrograme/ml picături oftalmice, soluție

- Scade PIO crescută la pacienții cu glaucom cu unghi deschis și hipertensiune intraoculară, putând fi utilizat la adulți, inclusiv vârstnici, la adolescenți și copii (de la naștere până la vârsta de 18 ani)³
- Prima alegere pentru pacienții nou diagnosticați⁴, conform recomandărilor EGS

Rata de progresie este
imprevizibilă în momentul diagnosticului⁴




Eficacitate similară în scăderea PIO
cu Bimatoprost și Travoprost¹



Studiu desfășurat pe 12 săptămâni ce a inclus 410 pacienți cu GUD sau PIO crescută (PIO ≥ 23 mmHg) tratați cu L=136 pacienți, B=136 pacienți, T=138 pacienți

Cea mai scăzută rată de incidență
a hiperemiei conjunctivale¹




Arucom


Latanoprost / Timolol
50 micrograme/ml + 5 mg/ml picături oftalmice, soluție

- Scade PIO crescută la pacienții cu glaucom cu unghi deschis și hipertensiune intraoculară, ce răspund insuficient la tratamentul cu β-blocante sau cu analogi prostaglandinici cu administrare locală⁵
- Alegerea de încredere când monoterapia devine insuficientă⁴

Eficacitate superioară în scăderea PIO
vs T/T și echivalență cu B/T²



Cea mai scăzută rată de incidență
a hiperemiei conjunctivale²



Studiu randomizat și prospectiv ce a inclus 128 pacienți cu GUD și PIO crescută (PIO ≥ 21 mmHg) ce a comparat efectul hipotensor și tolerabilitatea la 12 luni a celor 3 combinații fixe: L/T 42 pacienți, B/T 42 pacienți, T/T 44 pacienți

Latanoprost oferă echilibrul optim între
eficacitate în scăderea PIO și tolerabilitate¹

Latanoprost + Timolol oferă echilibrul optim între
eficacitate și tolerabilitate în terapia de linia a doua²