


Ialuvit

soluție oftalmică



ACCELEREAZĂ REEPITELIZAREA ȘI REINERVAREA CORNEANĂ

Favorizează
**PROCESUL DE
VINDECARE A
LEZIUNILOR
CORNEENE**

Susține
**PROCESUL DE
REGENERARE
A FIBRELOR
NERVOASE
CORNEENE
LEZATE**


FORMEAZĂ STRAT PROTECTOR VÂSCO-ELASTIC

**ACID
HIALURONIC**
hialuronat de sodiu 0,5%

B₁₂
CIANOCOBALAMINĂ 0,05%
CONTRIBUIE LA REGENERAREA NERVELOR CORNEENI


**Instilarea zilnică de Ialuvit
acelerează procesul de recuperare
a sensibilității corneene¹**

30 zile de tratament



*p < 0,05

30 zile de tratament



*p < 0,05

β-III tubulin și Neurofilament-160 sunt markerii utilizați pentru a verifica prezența fibrelor nervoase corneene la momentul inițial și la 30 de zile după îndepărtarea epiteliului corneean.

BENEFICIILE PENTRU PACIENT:

- ✓ **CONFORT DE LUNGĂ DURATĂ AL SUPRAFEȚEI OCULARE**
- ✓ **CREȘTEREA GRADULUI DE SATISFAȚIE POSTOPERATORIE**
- ✓ **RECUPERARE RAPIDĂ POSTOPERATORIE**

Compoziție - 100 ml soluție conțin: Hialuronat de sodiu 0,5 g, cianocobalamină 0,05 g, taurină 0,5 g, sorbitol, citrat trisodic, clorură de sodiu, clorură de potasiu, clorură de magneziu, fosfat de sodiu dibazic, dihidrogenofosfat de sodiu, apă pentru preparate injectabile. — **Ambalaj** - O cutie laluvit conține 15 flacoane resigilabile, de 0,6 ml. — **Ce este laluvit** - laluvit este o soluție oftalmică. — **Pentru ce se utilizează** - laluvit este o soluție cu un înalt conținut de hialuronat de sodiu (0,5%) care, datorită proprietăților sale mucomimetice și pseudoplastice, se distribuie uniform pe suprafața oculară formând un bandaj de protecție vâscoelastic. Astfel, laluvit stabilizează filmul lacrimal și reduce frecarea și solicitările cauzate de clipe și de mișcările oculare. Cianocobalamina și taurina, mai exact o vitamină din complexul B și un aminoacid, sunt prezente din punct de vedere fiziologic în țesuturile segmentului anterior al ochiului și, împreună cu acidul hialuronic, pot fi adjuvanți în procesul de reepitalizare a suprafeței corneene. laluvit are la bază o formulă de soluție hipotonică cu rol de compensare a hiperosmolarității filmului lacrimal și, datorită compoziției sale saline speciale, reface și menține la nivel fiziologic concentrația unor ioni importanți, precum sodiul, potasiul și magneziul, esențiali pentru sănătatea suprafeței oculare. — **Contraindicații** - Hipersensibilitate la componentele sale sau la alte substanțe strâns corelate din punct de vedere chimic. — **Precauții pentru utilizare** - laluvit este doar pentru uz extern. laluvit nu trebuie utilizat imediat înainte de administrarea medicamentelor în scopuri curative și nici în următoarele zece minute după administrarea topică a unui eventual tratament medicamentos. — **Cât de des și cât timp trebuie folosit laluvit** - Dozarea laluvit este individuală, în funcție de starea dumneavoastră și de recomandările medicului oftalmolog. În general, se instilează 1-2 picături de soluție în sacul conjunctival al fiecărui ochi, de câte 3-4 ori pe zi. — **Cum se aplică laluvit** - Pentru a reduce riscul de contaminare a produsului în timpul utilizării, punga de aluminiu trebuie deschisă numai în cazul utilizării imediate a produsului. Desprindeți un singur flacon de pe bandă. Pentru a deschide flaconul, îndepărtați clapeta superioară rotind-o, având grijă să o așezați pe o suprafață curată astfel încât să o puteți utiliza din nou la închiderea flaconului. Instilați 1-2 picături în fiecare ochi, lăsându-le să cadă de sus, astfel încât flaconul să nu vă atingă genele sau suprafața oculară. Închideți flaconul cu clapeta imediat după utilizare. laluvit poate fi utilizat și dacă purtați lentile de contact. — **Reacții adverse posibile** - În cazuri rare s-a observat o ușoară încrețșare a vederii în momentul instilării, care se datorează vâscozității soluției. Această senzație va dispărea, însă, foarte repede. Se poate manifesta, în cazuri rare, o intoleranță (senzație de arsură și/sau iritație); aceasta este fără consecințe și nu necesită modificarea tratamentului. În orice caz, vă recomandăm să contactați medicul oftalmolog în cazul prelungirii simptomelor. Respectarea instrucțiunilor din prospect reduce riscul de reacții adverse. — **Condiții de păstrare și perioada de valabilitate** - laluvit trebuie păstrat la o temperatură cuprinsă între 2°C și 25°C. Fiecare recipient poate fi închis, permițând astfel administrări repetate ale soluției, care trebuie utilizată totuși în decurs de 24 de ore de la prima deschidere întrucât nu conține conservanți. — **Atenționări** - Nu folosiți preparate după data de expirare indicată pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor. Culoarea roșie a produsului se datorează cianocobalaminii și nu indică alterarea produsului. În caz de utilizare cu lentile de contact, soluția oftalmică poate cauza o colorare a acestora; acest lucru este doar temporar și nu deteriorează în niciun mod lentilele.

laluvit

Reduce disconfortul ocular post-chirurgical:¹

OPERAȚII DE CATARACTĂ

CHIRURGIE REFRACTIVĂ (PRK, LASIK, SMILE)

CROSS LINKING

TRANSPLANT DE CORNEE

Accelerează procesul de reinervare corneană:²

KERATITE (VIRALE, NEUROTROFICE)

ABRAZIUNE CORNEANĂ

TRAUME (TERMICE, CHIMICE)

KERATOCONUS

DIABET ZAHARAT

1. Solignani F, Zurria M, Rolando M. Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2013, Vol.54, 4305. doi:

2. Romano MR et al. Experimental Eye Research 2014 Mar;120:109-17.