

Descoperă bucuria în fiecare zi



Neuropatiile mediate imun trebuie
diagnosticate cât mai devreme, deoarece
mulți pacienți răspund pozitiv la tratament¹

SGB

Tratamentul de primă intenție este
de obicei administrarea IG pe cale i.v.⁷

PICD

Opțiunile terapeutice sunt administrarea IG
pe cale i.v., corticosteriozi și plasmafereză¹⁻⁶

NMM

Opțiunea preferată este
administrarea IG pe cale i.v.⁴

Kiovig
Imunoglobulină umană normală
(IG i.v.) soluție 10%



O moștenire solidă cu un viitor clar în neurologie

Construit pe o moștenire de peste 60 de ani în Ig, Kiovig are
un deceniu de experiență medicală în neuropatiile periferice^{8,9}



Eficacitate stabilită¹⁰



**Profil de siguranță și
experiență în administrare¹⁰**

SGB = Sindrom Guillain Barré; PICD = Poliradiculoneuropatie inflamatorie cronică demielinizantă; NMM = Neuropatie motorie multifocală

Indicații terapeutice¹¹

Imunomodulare la adulți, copii și adolescenți (0-18 ani) în:

- Trombocitopenie imună primară (TIP) la pacienți cu risc crescut de sângerare sau anterior unei intervenții chirurgicale, pentru a corecta numărul de trombocite.
- Sindrom Guillain Barré.
- Boală Kawasaki (în legătură cu acidul acetilsalicilic).
- Poliradiculoneuropatie inflamatorie cronică demielinizantă (PICD).
- Neuropatie motorie multifocală (NMM).

Terapie de substituție la adulți, copii și adolescenți (0-18 ani) în:

- Sindroame de imunodeficiență primară (IDP) cu afectare a producerii de anticorpi.
- Imunodeficiențe secundare (IDS) la pacienții cu infecții severe sau recurente, cu tratament antimicrobian ineficient și fie au **deficiențe de anticorpi specifici dovedite (DASD)***, fie nivelul seric de IgG este <4 g/l.

*DADS = incapacitatea de a atinge o creștere de cel puțin 2 ori a titrului de anticorpi IgG la vaccinurile cu antigen pneumococic polizaharidic și polipeptidic

Referințe:

1. Katiří B and Koontz D. Disorders of peripheral nerves. In: Daroff RB, et al, eds. *Bradley's Neurology in Clinical Practice*. Vol 2. 6th ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2012: 1915–2015. 2. Taylor T. Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: in a remote northern Ontario hospital. *Can Fam Physician*. 2013;59(4):368–371. 3. Willison HJ, Jacobs BC, van Doorn PA. Guillain-Barré syndrome. *Lancet*. 2016;388(10045):717–727. 4. Vlam L, van der Pol WL, Cats EA, et al. Multifocal motor neuropathy: diagnosis, pathogenesis and treatment strategies. *Nat Rev Neurol*. 2012;8(1):48–58. 5. Callaghan BC, Price RS, Chen KS, Feldman EL. Peripheral neuropathy: the importance of rare subtypes. *JAMA Neurol*. 2015;72(12):1510–1518. 6. Van den Bergh PYK, Hadden RDM, Bouche P, et al. European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society guideline on management of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies and the Peripheral Nerve Society – first revision. *Eur J Neurol*. 2010;17(3):356–363. 7. Leonhard SE, Mandarakas MR, Gondim FAA, et al. Diagnosis and management of Guillain-Barré syndrome in ten steps. *Nat Rev Neurol*. 2019;15(11):671–683. 8. Italy CMG 1954 Approval Letter, Gamma Globulin. 9. NikolovN, Reisinger J, Schwarz HP. 10% liquid humanimmunoglobulin (KIOVIG®) for immunomodulation in autoimmune disorders. *Immunotherapy*. 2016;8(8):923–940. 10. Hahn AF, BeydounSR, Lawson V, et al. A controlled trial of intravenous immunoglobulin in multifocal motor neuropathy. *J PeripherNervSyst*. 2013;18(4):321–330. 11. Kiovig. Rezumatul caracteristicilor produsului (ultima revizuire 05.2020, accesat în 3 noiembrie 2021) este disponibil aici: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/kiovig-epar-product-information_ro.pdf

Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății.

KIOVIG 100 mg/ml soluție perfuzabilă cu administrare i.v. se eliberează pe bază de prescripție medicală restrictivă - PR.

Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată la Takeda Pharmaceuticals SRL, la adresa de email: AE.ROU@takeda.com sau la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, București 011478-RO Tel: +40757117 259, Fax: +40213163497, e-mail: adr@anm.ro

Rezumatul caracteristicilor produsului Kiovig (05/2020) este disponibil [aici](#).