


Ferinject® este asociat cu reducerea transfuziilor de masă eritrocitară



Administrarea preoperatorie de Ferinject® la pacienții chirurgici cu


Cancer de colon¹:

- a redus în mod semnificativ nevoia de transfuzii de masă eritrocitară (9,9% vs 38,7%; OR: 5,9, p<0,001)




Intervenții la nivel abdominal²

- a redus în mod semnificativ numărul de transfuzii administrate peri-operator în comparație cu tratamentul uzual (p<0,0003)



Chirurgie majoră elective³

- pacienții tratați cu Ferinject®, în comparație cu cei tratați cu fier sucroză, au necesitat mai puține transfuzii intraoperator și/sau postoperator (p<0,05)



1. Calleja JL et al. Int J Colorectal Dis 2016;31:543-551

2. Froessler B et al. Ann Surg 2016;264:41-6

3. Bisbe E et al. Br J Anaesth 2011;107(3):477-8

Informații abreviate din Rezumatul Caracteristilor Produsului Ferinject

▼ Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro>.

Denumirea comercială a medicamentului

Ferinject 50 mg fer/ml soluție injectabilă/perfuzabilă

Compoziția calitativă și cantitativă

Un ml de soluție conține fer 50 mg sub formă de carboximaltoză ferică. Fiecare flacon a 10 ml conține fer 500 mg sub formă de carboximaltoză ferică.

Excipienți cu efect cunoscut.

Un ml de soluție conține sodiu până la 5,5 mg (0,24 mmol).

Forma farmaceutică

Soluție injectabilă/perfuzabilă.

Soluție apoasă, de culoare brun închis, netransparentă.

Indicații terapeutice

Ferinject este indicat pentru tratamentul carenței de fier când:

- preparatele de fier orale nu sunt eficace.
- preparatele de fier orale nu pot fi utilizate.
- există o necesitate clinică de administrare rapidă de fier.

Diagnosticul de carență de fier trebuie să se bazeze pe analize de laborator.

Data revizuirii textului RCP Ferinject: Noiembrie 2020.

Acest medicament se eliberează pe bază de prescripție medicală PRF.

