

Hepiflor®

- Combinație de **3 tulpini probiotice** atent selecționate
- **Doză optimă** pentru reechilibrarea florei intestinale
- Viabilitate înaltă datorită tehnologiei **Bio-Support**
- **Triplă acțiune:** antimicrobiană, antiinflamatorie și imunomodulatoare
- Nu conține conservanți și gluten



Pentru a crea un microbiom echilibrat corespunzător, este importantă **variația tulpinilor** și **numărul bacteriilor**.



10
miliarde
UFC

Hepiflor®

- **Lactobacillus Acidophilus** HA-122 - 44,4 mg
- Lactobacilus casei HA-108 - 10,74 mg
- Bifidobacterium bifidum HA-132 - 10,52 mg

5
miliarde
UFC



Hepiflor®
pentru
bebeluși și copii

- Lactobacillus Rhamnosus HA 111 - 15,0 mg
- **Lactobacillus Acidophilus** HA 122 - 10,0 mg
- Bifidobacterium Infantis HA 116 - 18,0 mg

SC Terapia SA
a SUN PHARMA company

Sediul social: 400632, Cluj Napoca, Str. Fabricii nr. 124,
Nr. Înreg. Registrul Comerțului Cluj: J12/2038/2004

100
ani
Terapia
a SUN PHARMA company

Terapia probiotică

Abordare medicală de actualitate în
Sindromul de Intestin Iritabil




**Floră echilibrată,
sănătate curată!**

Hepiflor®

Tulburare intestinală în care durerea abdominală se asociază cu modificări ale tranzitului intestinal



Mecanisme locale prin care disbioza induce SII




Conform noului concept de boli funcționale propus de Fundația Roma, SII face parte din grupul bolilor caracterizate printr-o **tulburare a interacțiunii intestin-creier** (disorder of gut-brain interaction-DGBI).

Ref: 1. "Gut microbiota in patients with Irritable Bowel Syndrome – A systematic review; Rapat Pittayanon et.al; Gastroenterology 2019 Jul; 157(1):97-108"; 2. "Posibilele mecanisme locale prin care disbioza induce SII (modificat după Li, 2016, și Harris, 2017)"



PROBIOTICE → Strategie terapeutică în Sindromul de Intestin Iritabil



Conform unei metaanalize din 2012, tulpinile de **Lactobacillus** și **Bifidobacterium** sunt **cele mai eficiente bacterii probiotice în reducerea severității durerii și meteorismului din SII**.

Ref: "Strategii terapeutice de ameliorare a disbiozei pentru care există date experimentale sau clinice (modificat după Li, 2016, și Harris, 2017)."




Lactobacillus Acidophilus → Eficiență dovedită în studii clinice

Studiu clinic randomizat, controlat placebo:



- 80 de pacienți înrolați cu Sindrom de Intestin Iritabil
- Au fost măsurate la începutul studiului, la 4 și la 8 săptămâni, pe scala analog vizuală (VAS) următoarele simptome:



Conform studiului, **administrarea de Lactobacillus Acidophilus timp de 8 săptămâni în doză de $(5 \times 10^9$ UFC/capsulă) a dus la ameliorarea simptomelor asociate SII comparativ cu placebo.**

Ref: "A 2-strain mixture of Lactobacillus Acidophilus in the treatment of Irritable Bowel Syndrome: A placebo-controlled randomized clinical trial; Stéphane Sadrin; Digestive and Liver Disease 52 (2020) 534-540."