

- ❖ Mastodinie, mastopatie
- ❖ Tulburări de ciclu menstrual
- ❖ Sindrom premenstrual



	Mastodynon® comprimate	Mastodynon® 50 ml picături orale soluție	Mastodynon® 100 ml picături orale soluție
Compoziție	Vitex agnus castus D1 162 mg C. thalictroides D4 81 mg Cycl. purpurascens D4 81 mg Strychnos ignatii D6 81 mg Iris versicolor D2 162 mg Lilium tigrinum D3 81 mg	Vitex agnus castus D1 185 mg C. thalictroides D4 92,5 mg Cycl. purpurascens D4 92,5 mg Strychnos ignatii D6 92,5 mg Iris versicolor D2 185 mg Lilium tigrinum D3 92,5 mg	Vitex agnus castus D1 185 mg C. thalictroides D4 92,5 mg Cycl. purpurascens D4 92,5 mg Strychnos ignatii D6 92,5 mg Iris versicolor D2 185 mg Lilium tigrinum D3 92,5 mg
Doza zilnică	1 x 2 pe zi	30 pic. x 2 pe zi	30 pic. x 2 pe zi
Vârsta	Peste 12 ani	Peste 18 ani	

DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI: Mastodynon comprimate. Medicament homeopat. 3. FORMA FARMACEUTICĂ: Comprimat. Comprimat rotund, aplatizat, de culoare bej, cu posibilă ușoară pigmentație. 4. DATE CLINICE: 4.1 Indicații terapeutice: Mastodynon comprimate este indicat ca tratament la femeile aflate la vârsta fertilă care prezintă următoarele tulburări: tulburări menstruale determinate de insuficiența temporară sau permanentă de fază luteală; sindrom premenstrual cu tulburări cum sunt mastodinie, labilitate psihică, edeme, constipație, cefalee și migrenă; tulburări benigne dureroase la nivelul sânilor (mastopatie fibrochistică). Simptomele persistente, neclare sau recurente pot fi manifestările unei afecțiuni și necesită o reevaluare a diagnosticului și a tratamentului. Mastodynon nu trebuie administrat în tratamentul neoplasmelor mamare. 4.2 Doze și mod de administrare: Doza recomandată este de un comprimat de 2 ori pe zi (un comprimat dimineața și unul seara). Comprimatul se administrează cu suficient lichid (de exemplu un pahar cu apă). Mastodynon trebuie administrat timp de cel puțin 3 luni, inclusiv în timpul ciclului menstrual. În general, ameliorarea simptomelor apare după 6 săptămâni. Dacă simptomele revin după întreruperea administrării Mastodynon, tratamentul trebuie continuat, după un consult medical de specialitate. 4.3 Contraindicații: Hipersensibilitate la Vitex agnus castus, Caulophyllum thalictroides, Cyclamen purpurascens (sau alte specii de Primula), Strychnos ignatii, Iris versicolor, Lilium tigrinum sau la oricare dintre excipienți; Neoplasm al glandei pituitare; Carcinom mamar; Sarcină și alăptare. 4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare: Deoarece nu există date adecvate privind administrarea la copii cu vârsta sub 12 ani, Mastodynon nu trebuie administrat la această grupă de vârstă. Acest medicament conține lactoză. Pacienții cu afecțiuni ereditare rare de intoleranță la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze Mastodynon comprimate. Un comprimat Mastodynon conține aproximativ 0,02 unități de carbohidrat – acest lucru trebuie luat în considerare la pacienții cu diabet zaharat. 4.5 Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune: Nu se cunosc interacțiuni cu alte medicamente. Eficacitatea medicamentelor homeopate poate fi influențată de factori generali cu efect nociv asupra stilului de viață, de stimulente, alcool etilic și tutun. 4.6 Fertilitatea, sarcina și alăptarea: Mastodynon nu trebuie administrat în timpul sarcinii, deoarece nu există date adecvate privind administrarea la gravide. Dacă în timpul terapiei cu Mastodynon este diagnosticată sarcina, nu se recomandă continuarea tratamentului, deoarece simptomele tratate cu Mastodynon nu mai apar datorită modificărilor hormonale din sarcină. Prin urmare, tratamentul trebuie întrerupt. Mastodynon nu trebuie administrat în timpul alăptării deoarece nu există date adecvate privind administrarea la femeile care alăptează. Studiile la animale au evidențiat o reducere a lactației. 4.7 Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje: Mastodynon nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 4.8 Reacții adverse: Reacțiile adverse sunt clasificate pe aparate, sisteme și organe și în funcție de frecvență, după cum urmează: foarte frecvente (1/10); frecvente (1/100 și <1/10); mai puțin frecvente (1/1000 și <1/100); rare (1/10000 și <1/1000); foarte rare (<1/10000), cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). Pentru mai multe informații consultați RCP-ul produsului. Notă: Administrarea medicamentelor homeopate poate determina o agravare temporară a simptomelor preexistente (agravare inițială). În acest caz, administrarea medicamentului trebuie întreruptă și se recomandă consult medical de specialitate. 4.9 Supradozaj: Administrarea unor cantități mari de medicament poate determina tulburări gastro-intestinale sau efect laxativ la persoanele cu intoleranță la lactoză. 6. PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE: 6.1 Lista excipienților: Lactoză monohidrat, Amidon de cartof, Stearat de magneziu. 6.2 Incompatibilități: Nu este cazul. 6.3 Perioada de valabilitate: 3 ani. 6.4 Precauții speciale pentru păstrare: Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare. 6.5 Natura și conținutul ambalajului: Cutie cu 3 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 20 comprimate. 6.6 Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor: Fără cerințe speciale. 7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ: BIONORICA SE, Kerschenscheiderstraße 11-15, 92318 Neumarkt, Germania. 8. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ: 3764/2011/01-02-03 9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI: Septembrie 2011 10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI: Septembrie 2011.

Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății. Informații detaliate privind aceste medicamente sunt disponibile pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale: <http://www.anm.ro>. Medicamente eliberate fără prescripție medicală.

Durere la nivelul sânilor? Mastodinie?



Abordare
non-
hormonală




- ❖ Reduce tensiunea și durerea la nivelul sânilor¹
- ❖ Normalizează ciclul menstrual²
- ❖ Reduce frecvența mastodiniei¹

ALEGEREA NON-HORMONALĂ PENTRU RESTABILIREA
ECHILIBRULUI HORMONAL


1. Liebl A. Tratarea sindromului premenstrual TW Gynäkologie 1992
2. Mergner R. Tratamentul tulburărilor de ciclu menstrual, Der Kassernarzt 1992

Mastodynon® reduce semnificativ durerea la nivelul sânilor



Studiu realizat pe 596 de paciente cu sindrom premenstrual pe o perioadă de 3 luni

Mastodynon® normalizează ciclul menstrual



Studiu realizat pe 1307 de paciente cu tulburări de ciclu menstrual pe o perioadă de 3 luni



Concluzia: Mastodynon® a redus frecvența și intensitatea durerii de sân după **3 luni** de tratament¹



Concluzia: până la **82%** din cazurile de tulburări hormonale au fost normalizate²

